



RATS ET SOURIS APPÂTS EN BLOCS



Utilisation extérieure
autour des habitations




Rodenticide à base
de Difénacoum
(molécule anti-coagulante)



Contient un amérisant
pour prévenir l'ingestion
accidentelle par des
espèces non ciblées



Recommandé
par les professionnels



SOLU.FR
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM
PENNTYBIO.COM

Traiter juste. protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56

31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay
Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399

info@solu.fr

Pour la lutte contre les rats
et rongeurs des champs,
nous privilégions
les appâts en blocs



Nous recommandons les appâts en blocs pour les rats et autres rongeurs des champs, en raison de leur composition plus céréalière, particulièrement adaptée à leurs habitudes alimentaires. Ce format est à privilégier en extérieur, notamment à proximité des composts et des poulaillers.

	Nombre de sachet	Nombre de blocs	Sachets d'appât
Appât blocs	1	12	1 x 150 g
	3	36	3 x 150 g
	5	60	5 x 150 g

Appât

Nom homologué : STELLIOX®
AMM N°FR-2013-0058
Composition : Difénacoum 0,0025%
Usage : Rats, Souris.
N°CAS 56073-07-5. Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2), danger pour le milieu aquatique - toxicité chronique (catégorie 3)

Poste d'appâtage

Les postes d'appâtage ne sont pas fournis, mais leur utilisation est obligatoire avec des appâts anticoagulants : ils sécurisent l'appât et réduisent fortement le risque d'ingestion accidentelle par des enfants ou des animaux non ciblés.

Comment lutter efficacement les rats et rats des champs avec des appâts en blocs

Les rats (rat brun / surmulot) et les rats des champs peuvent devenir des nuisibles redoutables autour des habitations, bâtiments agricoles, entrepôts ou entreprises. Au-delà de la gêne, ils peuvent propager des maladies, souiller les denrées, et causer des dégâts importants (isolants, câbles électriques, cloisons, stockages). Heureusement, il existe des méthodes efficaces et réglementées pour contrôler ces rongeurs, notamment l'utilisation de postes d'appâtage et d'appâts anticoagulants. Ce guide vous donne les informations essentielles pour agir de manière sûre et efficace.

Comprendre le comportement des rats

Avant de commencer un traitement, il est important de comprendre leur comportement :

- Le rat brun (surmulot) est souvent présent près des zones humides, des égouts, des caves, des garages et des zones de stockage. Il se déplace volontiers le long des murs et cherche des sources de nourriture régulières.
- Les rats des champs (et autres rongeurs "de plein air") se rencontrent davantage en extérieur, autour des composts, poulaillers, abris de jardin, tas de bois, dépendances, ou zones avec graines et nourriture accessible.

Les rats sont généralement méfiants (néophobie) : ils peuvent mettre un peu de temps avant d'accepter un nouvel objet ou un nouvel appât. C'est pourquoi il est recommandé de sécuriser les appâts dans des postes d'appâtage, de placer plusieurs points sur leurs trajets (le long des murs, passages, abords des terriers), et de laisser le dispositif en place le temps qu'ils s'habituent.

Enfin, pour les rats et rongeurs d'extérieur, les appâts en blocs sont particulièrement adaptés : leur composition plus céréalière correspond mieux à leurs habitudes alimentaires, et leur format est pratique à fixer dans un poste d'appâtage, notamment à proximité des composts et des poulaillers.

Remplissage et sécurisation du poste

Ouvrir le poste d'appâtage (non fournis). Placez les appâts à l'intérieur sur la tige prévu à cet effet. Placer 50g à 100g d'appât bloc par poste sécurisé. Enlevez la clé et fermez le poste (vous devez entendre un clic). Si plusieurs postes sont installés, la distance minimale séparant deux postes doit être de 5 à 10 mètres.



Emplacement et installation des postes

Installez les postes d'appâtage près des zones où vous avez observé une activité de rongeurs (esquémements, alimentation grignotée, objet ou aliments non à leur place). Placez les postes près des murs, des recoins ou des zones d'activité, car les rongeurs préfèrent se déplacer le long des murs. Veillez à installer les ouvertures par où passe le rongeur contre un mur.

Surveillance et usage

Inspectez et réapprovisionnez les boîtes d'appât 5 à 7 jours après la 1ère application puis une fois par semaine. Remplacez l'appât au besoin. Si vous remarquez une diminution significative de l'activité des rongeurs ou de la consommation d'appâts, cela peut indiquer une réduction de la population.

Mode d'action

Le rongeur rentre dans le poste par une des ouvertures sur le côté de celui-ci. Il va consommer les appâts sur place et ressortir du poste. À partir de 3 jours, le rongeur montre des signes de faiblesse et fini par succomber dans son nid.

Délai nécessaire pour l'apparition de l'effet anticoagulant: compris entre 3 et 14 jours après l'ingestion de l'appât. Ce délai est nécessaire pour éviter la méfiance de ses congénères et la non consommation des appâts.

Précautions et sécurité

L'utilisation de produits anticoagulants n'est pas sans risques. Voici quelques précautions à prendre :

- Évitez l'ingestion accidentelle : Stocker les appâts dans des endroits où les enfants et les animaux domestiques ne peuvent pas les atteindre.
- Utilisez des gants : Portez toujours des gants lorsque vous manipulez des appâts et des souris mortes pour éviter tout contact avec le poison.
- Consultez des professionnels : Si vous n'êtes pas sûr de la procédure ou si l'infestation persiste, il peut être judicieux de consulter un professionnel de la lutte antiparasitaire.

La lutte contre les rongeurs avec des postes d'appâtage et des produits anticoagulants est une méthode efficace pour contrôler ces nuisibles. En suivant les étapes et les précautions décrites dans ce guide, vous pouvez sécuriser votre maison, votre extérieur ou votre entreprise contre les invasions de rongeurs. Cependant, il est toujours préférable de combiner ces méthodes avec une bonne hygiène et des mesures préventives pour obtenir les meilleurs résultats. En effet, nettoyer les zones aux abords et retirer les sources alimentaires.

N'oubliez pas que la gestion des nuisibles peut parfois nécessiter plusieurs approches et réajustements, alors restez vigilant et proactif dans votre lutte.